

リフヌア[®]錠による 「味覚異常」のチェックリスト

監修 新海 正晴 先生 東京品川病院 副院長/治験開発・研究センター長

リフヌア[®]錠を服用した際に多く現れる副作用は、「味がわからない」「味が変わった」などの味覚異常であり、感じ方や現れる時期には個人差があります。

もし、患者さんに味覚異常が現れた場合は、本チェックリストにて味覚の状態をご確認いただけます。



1 この1週間での「味覚異常」の度合いはどのくらいですか？
0～100の間で当てはまる箇所を指で示してください。



2 どのような味覚異常を感じますか？当てはまるものを選んでください。

 塩味	 苦味/甘いものが 苦く感じる	 金属味	 一部の味だけ 感じない	 味が薄く感じる	 味を まったく感じない	etc その他 (嫌な味になる 等)
---	--	--	---	---	---	--------------------------

3 リフヌア[®]錠を服用し始めてから何日で味覚異常を感じましたか？
感じ始めた時期を選んでください。

1日以内	3日以内	5日以内	9日以内	2週間以内	1ヵ月以内	3ヵ月以内
------	------	------	------	-------	-------	-------

4 リフヌア[®]錠による味覚異常を感じてから(あるいは服用を止めてから)何日で元に戻りましたか？
現在の服用状況と味覚異常が元に戻った時期をそれぞれ選んでください。

現在の服用状況		味覚異常が元に戻った時期 (対象患者さんのみ)				
現在服用 している	服用を 止めた	1日以内	3日以内	5日以内	2週間以内	2ヵ月以内

Kyorin 

